

Esmeralda

Type chair ferme

Obtenteur : Station de Recherche du Comité Nord, France

Inscription en France en 2009

Caractéristiques de la variété

Croisement Pompadour x (Ausonia x Gloria)

Maturité Demi-précoce
(environ 110 jours de végétation)


Forme du tubercule Oblong allongé à allongé
très régulier

Couleur Peau et chair jaune pâle,
yeux très superficiels

Matière sèche 19 à 19.5 %

Rendement Forte tubérisation
(supérieure à Charlotte), homogène,
optimum en 35/55 convenant également
parfaitement en spécificité grenaille

Qualité culinaire Parfaite tenue, ne noircissant pas
après la cuisson, adaptée à la
cuisson vapeur



Maladies

Sensibilité Mildiou du feuillage,
moyennement sensible

Résistance Qualité de présentation optimum
en parcelle irriguée,
bonne résistance au marquage des
lenticelles, résistant au nématode
Globodera rostochiensis RO1-4,
sensibilité faible à la gale commune

Itinéraire technique

Fumure Besoin azoté total comprenant les
réserves du sol : 200 u / ha

Plantation Sortie frigo, laisser réchauffer deux
semaines, germination moyennement
rapide

Densité de plantation conseillée :

Calibres	Densité /ha
25/32	50.000 plants /ha
32/35	42.000 plants /ha
35/45	38.000 plants /ha
35/55	35.000 plants /ha

Conservation

- Très bonne tenue à la conservation et bonne
résistance au verdissement
(à la lumière dans l'étalage du magasin)

Pour plus d'information, contactez :

M. Olivier FERON
Mobile: +33 (0)6 15 22 96 96
ste-siac@orange.fr

M. Franck HERICHER
Mobile: +33 (0)6 85 75 71 51
franck.hericher@orange.fr